

V/v thông báo thuốc mới

Quang Bình, ngày 05 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: - Các khoa lâm sàng;
- Khoa Khám bệnh.

Căn cứ Thông tư 30/2018/TT – BHYT của Bộ y tế ngày 30/10/2018 về việc ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.

Căn cứ vào quyết định số 958/QĐ – SYT ngày 1/11/2019 của Giám Đốc Sở Y Tế tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mua thuốc tân dược, thuốc Đông Y, thuốc từ dược liệu cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2019-2021

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng thuốc tại BVĐK Quang Bình năm 2021.

Khoa dược xin thông báo hiện trong khoa dược bệnh viện có thuốc sau
Thuốc viên: **BIVALTAX 10mg (Loratadin).**

• **Dược lực học:**

Loratadin là thuốc đối kháng thụ thể H1, thế hệ thứ 2 (không an thần).

Loratadin là một thuốc kháng histamin 3 vòng có tác dụng kéo dài với hoạt tính đối kháng chọn lọc trên thụ thể H1 ở ngoại biên và không có tác dụng làm dịu trên thần kinh trung ương. Thuốc có tác dụng làm giảm bớt triệu chứng của viêm mũi và viêm kết mạc dị ứng do phóng thích histamin. Loratadin còn có tác dụng chống ngứa và nổi mề đay liên quan đến histamin. Thuốc bắt đầu có tác dụng kháng histamin trong vòng 1-4 giờ, đạt tối đa sau 8-12 giờ và kéo dài hơn 24 giờ và không gây tác dụng phụ an thần.

• **Chỉ định:**

- Điều trị triệu chứng liên quan đến viêm mũi dị ứng theo mùa, viêm mũi dị ứng quanh năm như hắt hơi, chảy nước mũi, ngứa mũi, cũng như ngứa và xót mắt.

- Điều trị các triệu chứng, dấu hiệu mày đay mạn tính và các rối loạn dị ứng ngoài da khác.

- **Liều dùng và cách dùng:**

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: ngậm 1 viên, 1 lần mỗi ngày

- Trẻ em từ 9 - 12 tuổi có thể trọng $\geq 30\text{kg}$: ngậm 1 viên, 1 lần mỗi ngày.

Do dạng bào chế không thích hợp, không dùng cho trẻ em dưới 9 tuổi.

Không cần giảm liều cho người cao tuổi.

Đối với người suy gan hoặc suy thận (độ thanh thải creatinin $< 30\text{ml/ph}$):
Liều 5mg/ngày hoặc 10mg mỗi 2 ngày.

- **Tác dụng không mong muốn:**

Thuốc không gây loạn nhịp nặng như khi dùng 1 số thuốc kháng histamin thế hệ 2 khác. Khi dùng liều $> 10\text{mg}$ mỗi ngày có thể có tác dụng phụ như: Đau đầu, khô miệng, mệt mỏi; Ít gặp chóng mặt, viêm kết mạc, khô mũi và hắt hơi.

- **Chống chỉ định:**

Quá mẫn cảm với loratadin hay với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Nơi nhận:

-Như Kg;

-Lưu ĐV TTT.

Đơn vị thông tin thuốc



Phạm Thị Hồng Thủy